

Übungen zu Höhere Mathematik für Physiker II

Blatt 2

- 1 Sei (E, d) ein metrischer Raum und $x_n \rightarrow x$, $y_n \rightarrow y$ konvergente Folgen in E , dann gilt

$$d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y).$$

4

- 2 Für die Exponentialfunktion $\exp x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ gilt:

14

- (i) $x_k \rightarrow x \implies \exp x_k \rightarrow \exp x$
- (ii) $\exp x$ ist monoton wachsend und bildet \mathbb{R} bijektiv auf \mathbb{R}_+^* ab. Definiere $\log x$ als die Inverse.
- (iii) Es gilt $(\exp x)^y = \exp xy \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{Q}$.
- (iv) Setze $e = \exp 1$, so folgt $e^x = \exp x \quad \forall x \in \mathbb{Q}$. Diese Gleichung verwenden wir auch als Definition, um e^x für irrationale x zu definieren.
- (v) Für $a > 0$ gilt $a^x = e^{x \log a} \quad \forall x \in \mathbb{Q}$. Diese Gleichung verwenden wir auch als Definition, um a^x für irrationale x zu definieren.
- (vi) Bestimmen Sie die Inverse φ von a^x , falls $0 < a \neq 1$, und zeigen Sie, daß
 - (1) $\varphi(xy) = \varphi(x) + \varphi(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}_+^*$.
 - (2) $\varphi(b^x) = x\varphi(b) \quad \forall b > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 - (3) $x_k \rightarrow x_0 \implies \varphi(x_k) \rightarrow \varphi(x_0)$.
- (vii) Welches Monotonieverhalten besitzt a^x ?

- 3 Sei I eine beliebige Indexmenge und $(a_i)_{i \in I}$ eine Familie von nicht-negativen Zahlen. Nehme an, es existiere eine Konstante c , so daß

$$\sum_{i \in J} a_i \leq c \quad \forall J \subset I, J \text{ endlich,}$$

dann sind h.a. viele $a_i \neq 0$.

6

- 4 Sei $((a_n))$ eine nur bedingt konvergente Reihe in \mathbb{R} , dann sind die Reihen $((a_n^+))$, $((a_n^-))$ divergent, wobei wir für $a \in \mathbb{R}$ definieren

$$a^+ = \max(a, 0), \quad a^- = -\min(a, 0).$$

6